



AMPUTACIONES TRAUMATICAS

PASOS:

1. LLAME PARA PEDIR AYUDA MÉDICA.
2. EN LO POSIBLE, TRATE DE CALMAR Y DARLE SEGURIDAD A LA PERSONA. LAS AMPUTACIONES SON DOLOROSAS Y EXTREMADAMENTE ATemorIZANTES.
3. CONTROLE LA HEMORRACIA APLICANDO PRESIÓN DIRECTA SOBRE LA HERIDA.
4. ELEVE EL ÁREA LESIONADA. SI LA HEMORRACIA CONTINÚA, REVISE DE NUEVO LA FUENTE DEL SANGRADO Y VUELVA A APLICAR PRESIÓN DIRECTA, CON LA AYUDA DE ALGUIEN QUE NO ESTÉ FATIGADO. SI LA PERSONA ESTÁ SUFRIENDO UNA HEMORRACIA POTENCIALMENTE MORTAL, SERÁ MÁS FÁCIL EMPLEAR UN TORNQUETE O UN VENDAJE APRETADO QUE PRESIÓN DIRECTA SOBRE LA HERIDA. SIN EMBARGO, USAR UN VENDAJE APRETADO POR MUCHO TIEMPO PUEDE HACER MÁS MAL QUE BIEN.
5. CONSERVE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO CERCENADA Y ASEGÚRESE DE QUE PERMANEZCA CON LA PERSONA. RETIRE CUALQUIER MATERIAL SUCIO QUE PUEDA CONTAMINAR LA HERIDA SI ES POSIBLE Y ENJUAGUE LA PARTE DEL CUERPO MUY SUAVEMENTE SI EL EXTREMO DEL CORTE ESTÁ SUCIO.
6. ENVUELVA LA PARTE CERCENADA EN UN TROZO DE TELA LIMPIO Y HÚMEDO, COLÓQUELO EN UNA BOLSA PLÁSTICA SELLADA Y SUMERJA LA BOLSA EN AGUA HELADA.
7. NO COLOQUE LA PARTE AFECTADA DIRECTAMENTE EN AGUA NI HIELO SIN USAR UNA BOLSA PLÁSTICA.
8. NO COLOQUE DIRECTAMENTE LA PARTE CERCENADA EN HIELO. NO USE HIELO SECO, YA QUE ESTO PRODUCE CONGELACIÓN Y LESIÓN DE LA PARTE AFECTADA.
9. SI NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA FRÍA, MANTENGA LA PARTE ALEJADA DEL CALOR TANTO COMO SEA POSIBLE. CONSÉRVELA PARA ENTREGÁRSELA AL EQUIPO MÉDICO O LLÉVELA AL HOSPITAL. EL HECHO DE ENFRIAR LA PARTE CERCENADA PERMITE UNA VENTANA DE TIEMPO MÁS LARGA PARA UNA REIMPLANTACIÓN POSTERIOR. DE LO CONTRARIO, SÓLO SE CON-