Xuất ngoại BC

Hồng cầu cũng có thể thoát khỏi mạch (thụ động) khi tổn thương nặng vách mao quản

?: BC thoát khỏi máu
=> đi vào mô quanh mạch

Process: lăn — dừng lại & dính — chui vùng nối gian bào (vùng giữa các TB nội mô, đã giãn rộng) → màng đáy → khoang gian bào ngoài mao mạch

Loại BC trong ổ viêm

phụ thuộc
- thời gian
- tác nhân

- 6-24h đầu: ĐNTT
  - lifespan ngắn
  - xuất ngoại nhanh
- 24-48h: Mono lớn
  - lifespan dài
  - xuất ngoại chậm

bị các yt HUD thu hút ở những thời điểm khác nhau

Thực tế có nhiều ngoại lệ
- *Nhiễm khuẩn do Pseudomonas: ĐNTT 2-4 ngày*
- *Nhiễm virus: Lympho*
- *P/u quá mẫn: ĐN ái toan*

Hóa ứng động

?: BC di chuyển theo hướng nhất định về phía chất hút

Chất HUD
- SP của VK
- Bổ thể:
  - C3a, C5a
  - C5b,6,7
- SP chuyển hóa của a.arachidonic theo đường lipoxygenase (esp: leukotrien B4)
- SP phân hủy TB, vụn collagen
- SP phân hủy tơ huyết

BC vận động kiểu gì?
- Tung chân giả
- Kéo phần còn lại theo hướng chân giả

What's inside chân giả?

Lưới vi sợi
- Actin
- Myosin

Điều hòa bởi Calmodulin:
- Protein gắn Ca2+
- Kiểm soát sự tạo myosin

LIVEWORKSHEETS