


Reacció adversa a medicaments (RAM)

Una **Reacció adversa a medicaments (RAM)** és qualsevol resposta nociva i no intencionada a un medicament. Podem classificar aquestes reaccions en dos tipus: Tipus A i Tipus B

Tipus A ("augmented")

Són el resultat d'un augment en l'acció farmacològica del medicament quan s'administra a la dosi terapèutica habitual. Per exemple, pressió arterial baixa amb antidepressius, l'hipoglucèmia amb insulina.

Així mateix, les tipus A també inclou aquelles que no estan directament relacionades amb l'acció farmacològica desitjada del fàrmac. (per exemple, la sequedat de boca, que s'associa amb els antidepressius tricíclics, sobreinfeccions per micobacteris en pacients d'artritis reumatoide controlats per infliximab)




Tipus B ("bizarre")

Són reaccions que no s'esperen de les conegudes accions farmacològiques del fàrmac.

Per exemple, xoc anafilàctic amb penicil·lina, erupcions cutànies amb antibiòtics.

Reacció adversa a medicaments (RAM)



Segons les definicions i exemples de les reaccions adverses a medicaments (RAM) de tipus A i tipus B de la [diapositiva anterior](#), ara cal anar a la següent diapositiva per tal de resoldre l'activitat plantejada. Aquesta activitat consisteix en arrossegar cadascuna de les característiques etiquetades dins del tipus de reacció adversa, A o B.

Reacció adversa a medicaments (RAM)

Predictibles

Alta morbiditat

Alta mortalitat

Respon a una reducció de la dosi

No Predictibles

Baixa morbiditat

Baixa mortalitat

Respon a la retirada del fàrmac

Normalment dosi-depenent

Rarament dosi-depenent



Tipus A ("augmented")



Tipus B ("bizarre")