

## Aproximaciones y errores

- La **aproximación** de un número es el resultado de buscar un **valor próximo a su valor original**. Puede ser por **exceso** (mayor que el valor original) o por **defecto** (menor que el valor original).

3,4567... → 3,45 (por defecto) / 3,457 (por exceso)

- Las aproximaciones se pueden efectuar por **dos métodos**:

- **Truncamiento**: el número decimal **se interrumpe** en una posición concreta:

12,657489 → 12,657**489** → 12,657

- **Redondeo**: se tiene en cuenta la **primera cifra que hay que suprimir**:

Si es **menor que 5**, se **conserva** el valor:

9,345678 (a centésimas) → 9,34**5678** → 9,34

Si es **igual o mayor que 5**, la cifra anterior **aumenta una unidad**:

9,345678 (a milésimas) → 9,34**5678** → 9,346

- El número de **cifras significativas** indican la **precisión** de una cantidad:

3,47 → **Tres** cifras significativas (3, 4, 7)      3,470 → **Cuatro** cifras significativas (3, 4, 7, 0)

- Los **errores** se producen en cualquier aproximación numérica, como es el caso de las mediciones. Se pueden cuantificar de dos maneras:

- **Error absoluto** =  $|valor\逼近ado - valor\exacto|$

- **Error relativo** =  $\frac{|valor\逼近ado - valor\exacto|}{valor\exacto}$

1 Completa:

Número	Truncamiento a milésimas	Redondeo a centésimas	Aproximación por defecto a centésimas	Aproximación por exceso a décimas
1,353637				
6,4334343...				
5,1368368368...				

2 Del número 5,076893..., escribe:

- Una aproximación por defecto con tres cifras significativas.
- Una aproximación por exceso con dos cifras significativas.

3 Al medir un hectómetro se han hallado los valores de esta tabla; complétala:

Valor逼近ado	Valor exacto	Error absoluto	Error relativo
101 m			
99,04 m			
100,053 m			