Distribución Ji cuadrada

2.¿La distribución Ji cuadrada puedo aplicarla a los datos nominales?

3.Completar

La distribución ji cuadrada es una prueba

4. Marca las opciones correctas

¿Qué tipo de pruebas puedo realizar con la distribución Ji cuadrada?

contingency test

hypothesis test

Tets goodness for fit

Test for Independence

Complete con verdadero falso

Características de la distribución ji-cuadrada

Depende del tamaño de la muestra.....

No es necesario formular supuestos sobre la forma de la población.....

Tiene un sesgo negativo.....

El valor del estadístico de prueba jí cuadrada es de -1 a 1.....

Cuando los grados de libertad son mayores a cero curva se acerca a la distribución F

Unir con flecha

Fórmula de cálculo estadístico de

prueba bondad de ajuste

 $\chi^2 = \sum \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$

Grados de libertas de una

prueba bondad de ajuste

(K -1)(C-1) (K -1)

Grados de libertas de una prueba de

independencia

Fórmula de cálculo estadístico de

prueba de independencia

$$\chi_{C}^{2} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{m} \frac{\left(O_{ij} - E_{ij}\right)^{2}}{E_{ij}}$$

Donde

 $E_{ij} = n \; p_L * p_J \;$ representan las frecuencias esperadas y $\; n = \; \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m O_{ij} \;$



Prueba bondad de ajuste

Nos permite probar si existe una diferencia significativa entre la distribución de frecue ncia observada y una distribución de frecuencia teórica

Determinar si cierto conjuntos de datos puede representarse Cómo una determinada distribución de probabilidad

Unir con flecha Pasos de hipótesis de una prueba de bondad de ajuste

Paso 1 Determinar el estadístico de prueba y g rados de libertad Paso 2 Determinar La hipótesis nula y la hipóte Paso 3 sis alterna Determinar el nivel de significancia Paso 4 Determinar el estadístico de prueba Paso 5 Determinar Estadístico de prueba está Paso 6 en la zona de aceptación o en la zona de rechazo Conclusión



