

ACT4. Les constants vitals i els sentits del nounat

1. COMPLETA els enunciats següents emplenant els espais en blanc amb l'opció correcta:

La freqüència respiratòria del nadó oscil·la entre rpm els primers mesos. A l'any de vida el seu FR varia fins a un rang d'entre rpm.

La freqüència cardíaca d'un nounat i fins als 3 mesos té un rang molt ampli. Podeu variar des de i fins a bpm; la mitjana del seu FC és bpm.

La tensió arterial va augmentant a mesura que el nadó creix fins que s'estabilitza en els valors normals de l'edat adulta. La sistòlica es troba entre 60 - mmHg i la diastòlica entre 20 - mmHg.

Valors normals de temperatura axil·lar en un nounat a terme van de a °C.

2. COMPLETA els enunciats següents emplenant els espais en blanc amb l'opció correcta:

L' està completament desenvolupada en el nounat. Respon als canvis de posició i moviments de balanceig gràcies al desenvolupament del seu òrgan .

Els nounats distingeixen llum i , però no poden veure tots els . Les primeres setmanes són capaços d'enfocar uns cm (distància entre l'adult i el nadó quan se sosté en braços).

Un nounat utilitza els i la per discriminar el contorn, la forma i la textura de les coses del món que l'envolta.

En els primers mesos de vida comencen a desenvolupar-se les . Els nounats mostren predilecció per sabors davant agres o .

Tenen perfectament desenvolupat l'olfacte al moment del naixement i mostren preferència per l'olor de la i la llet materna.

3. **RELACIONA** els reflexos següents amb la seva explicació:

Reflex de prensió palmar	El nadó obre els dits dels peus en ventall quan es frega la planta del peu en direcció posteroanterior.
Reflexió de succió i orientació	El nadó tanca la mà de manera reflexa quan alguna cosa frega el seu palmell.
Reflex de Moro o sobresalt	En resposta a un estímul sobtat de caiguda o un soroll fort, el nadó estén el coll, obre els braços i les cames i emet un so de plor.
Reflex de Babinski	Quan es gira el cap del nadó cap a un costat, estén el braç del mateix costat i flexiona la cama i el braç del costat contrari.
Reflex de la marxa	Quan se sosté el cos del nadó de manera vertical i es col·loquen els peus sobre una superfície realitza gestos que recorden la marxa, aixecant alternativament els dos peus.
Reflex tònic del coll	El nadó comença la succió quan alguna cosa frega els seus llavis o se li col·loca alguna cosa a la boca.