

១. គេយកកុងដង់សាទ័រ $C_1 = 3F$ និង $C_2 = 6F$ ទៅផ្គុំជាស៊េរី។ ចូរគណនាកាប៉ាស៊ីតេសមមូលនៃបង្កំ?

ចម្លើយ

២. គេមានកុងដង់សាទ័របីដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ $C_1 = 2\mu F$, $C_2 = 3\mu F$, $C_3 = 6\mu F$ ផ្គុំជាស៊េរី។ ចូរគណនាកាប៉ាស៊ីតេសមមូលនៃបង្កំ?

ចម្លើយ

៣. គេយកកុងដង់សាទ័រ $C_1 = 5F$ និង $C_2 = 7F$ ទៅផ្គុំជាខ្លែង។ ចូរគណនាកាប៉ាស៊ីតេសមមូលនៃបង្កំ?

ចម្លើយ

៤. គេមានកុងដង់សាទ័របួនដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ $C_1 = 4\mu F$, $C_2 = 6\mu F$, $C_3 = 8\mu F$, $C_4 = 10\mu F$ ផ្គុំជាខ្លែង។ ចូរគណនាកាប៉ាស៊ីតេសមមូលនៃបង្កំ?

ចម្លើយ