

EVALUACIÓN PARCIAL: MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Examen de Correlación de Conceptos - Infecciones Agudas de la Vía Aérea Superior

Nombre del Alumno: _____ Fecha: _____

Grupo / Grado: _____ Calificación: _____

Instrucciones generales: Relaciona de manera correcta los conceptos, microorganismos o hallazgos clínicos de la **Columna A** con su correspondiente descripción, definición o fundamento patológico ubicado en la **Columna B**. Escribe la letra mayúscula correcta dentro del paréntesis de la columna central. Cada reactivo tiene un valor de 10 puntos (Total: 100 puntos). Evita tachaduras, enmendaduras o usar corrector.

COLUMNA A: Concepto / Agente	Sél.	COLUMNA B: Definición, Clínica o Fisiopatología
1. Parainfluenzavirus tipo 1	()	A. Hallazgo radiológico característico en sinusitis que se moviliza con el decúbito lateral y posee una estrecha correspondencia con la positividad del cultivo del aspirado sinusal.
2. <i>Streptococcus pneumoniae</i> y <i>Haemophilus influenzae</i>	()	B. Agente etiológico viral más importante en el origen de la laringotraqueitis aguda (crup), con picos de incidencia máxima durante otoño e invierno.
3. <i>Streptococcus pyogenes</i>	()	C. Estudio radiológico simple empleado de primera línea para evaluar los senos maxilares y frontales, útil para descartar obstrucciones ostiales.
4. Signo de la huella digital	()	D. Microorganismos bacterianos que representan las causas más frecuentes de sinusitis aguda, siendo responsables del 70% de los casos.
5. Tumor turgente de Pott	()	E. Principal estreptococo β -hemolítico causante de faringitis aguda bacteriana en niños de 2 a 10 años, requiriendo antibioterapia pronta para prevenir complicaciones supurativas y no supurativas.
6. Agonistas α_1 -adrenérgicos tópicos	()	F. Hallazgo radiológico visible en la proyección lateral de cuello debido al engrosamiento marcado de la epiglotis edematosa y la consecuente dilatación hipofaríngea.
7. Proyección de Waters	()	G. Manifestación inicial clínica de una sinusitis frontal avanzada que cursa con tumefacción localizada y edema blando en el hueso frontal a causa de un absceso subperióstico.
8. Virus Coxsackie A	()	H. Fármacos descongestionantes eficaces que reducen la vasodilatación y el incremento de permeabilidad vascular, pero cuyo uso continuado por más de 3 o 4 días seguidos produce rinitis medicamentosa.
9. Punción directa de los senos	()	I. Patógeno causante de la herpangina infantil, caracterizada clínicamente por lesiones eritematovesiculosas típicas localizadas en la mucosa faringoamigdalares.
10. Nivel hidroaéreo	()	J. Procedimiento invasivo que constituye el estándar clínico para el diagnóstico de seguridad de la sinusitis bacteriana aguda, indicado ante la falta de respuesta terapéutica.