

Relaciona las columnas:

4.5 a 6.5

Higiene bucal del recién nacido

Factores de protección

Anorexia, bulimia, obesidad

Bajo flujo salival

Cavidad bucal del recién nacido

Quiste de erupción

Cariograma

Índice de cuidados dentarios

Prevalencia de caries

2.7 a 4.4

Factores de riesgo

Fase eruptiva prefuncional

SiC

Higiene, agua con fluoruro, profilaxis, selladores, alimentación no cariogénica, barniz de flúor

Baja ingesta de agua

Diente presente en boca sin contacto con antagonista

Cuantificación alta OMS para CPOD

Rodete de succión, frenillos labial y lingual, rodetes gingivales, papila y rugosidades palatinas, cordón fibroso de Robin y Magitot

El tercio de una población más afectada por caries, ordenada de acuerdo con el CPOD

Cuantificación moderada OMS para CPOD

Bajo peso al nacer, biofilm visible, disfunción salival, condición sistémica, infección por E mutans y lactobacilos, consumo de sustancias nocivas, alimentación frecuente/ dieta cariogénica, deficiente resistencia del esmalte, anatomía dental, restauraciones previas

Uso de gasa para limpiar encías después de cada alimentación al seno materno

Interconsulta con nutriólogo

Aumento de volumen en la zona donde erupcionará o emergerá un diente

Atención restauradora a la que estuvo expuesta la población